

Impfkalender: Übersicht der empfohlenen Standardimpfungen der STIKO

In welchem Alter impfen?	Gegen welche Krankheit?	Standardimpfung / Impfschutz		
Standardimpfungen für Säuglinge/Babys/Kleinkinder				
6 Wochen	Rotaviren	2 oder 3 Schluckimpfungen im Abstand von 4 Wochen		
2, 4 und 11 Monate	Tetanus (Wundstarrkrampf), Diphtherie, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Hib-Gehirn- hautentzündung, Pertussis (Keuchhusten), Hepatitis B und Pneumokokken (u.a. Sepsis)	3 Kombinationsimpfungen mit einem Sechsfach-Impfstoff und 3 Pneumokokken-Impfungen		
Ab 9 bis 11 Monate (ab 9 Monate, wenn das Kind eine Kita besucht)	Masern, Mumps, Röteln und Windpocken (Varizellen)	1. Kombinationsimpfung (Masern-Mumps- Röteln, MRR) 1 Varizellen-Impfung		
15 Monate		2. Kombinationsimpfung MRRV		
12 Monate	Meningokokken C (Gehirnhautentzündung, Sepsis)	1 Impfung		



In welchem Alter impfen?	Gegen welche Krankheit?	Standardimpfung / Impfschutz		
Standardimpfungen für Kinder und Jugendliche ab 5 bis 18 Jahren				
5 bis 6 Jahre	Tetanus (Wundstarrkrampf), Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten)	Auffrischimpfung mit einem Kombina- tions-Impfstoff		
9 bis 16 Jahre	Tetanus (Wundstarrkrampf), Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten) und Poliomyelitis (Kinderlähmung)	2. Auffrischimpfung mit einem Kombina- tions-Impfstoff		
9 bis 14 Jahre	Humane Pappillom-Viren (HPV).	2 Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten		
Bis zum 18. Geburtstag sind Nachhol-Imp- fungen bei fehlenden Impfungen möglich	Nachhol-Impfungen gegen bestimmte Krank- heiten – je nach bereits erfolgten Impfungen	Abhängig von den bereits erfolgten Imp- fungen – bis zum 18. Geburtstag werden die empfohlenen Impfungen von den Kranken- kassen erstattet		



In welchem Alter impfen?	Gegen welche Krankheit?	Standardimpfung / Impfschutz	
Standardimpfungen und Auffrischimpfungen für Erwachsene			
Ab 18 Jahren – etwa alle 10 Jahre	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und gegebenenfalls Kinderlähmung (falls Imp- fung fehlt)	1. Auffrischimpfung mit einem Kombina- tions-Impfstoff	
Ab 18 bis etwa 50 Jahre – alle nach 1970 geborenen Erwachsenen	Masern (bei fehlender Impfung)	1 Impfung mit einem Kombinations-Impf- stoff (MMR)	
Ab 60 Jahren	Grippe (Influenza)	1 Impfung jedes Jahr im Herbst	
	Lungenentzündung (Pneumokokken)	1 Impfung (bei Risikogruppen ggf. weitere Impfungen)	
	Gürtelrose (Herpes Zoster)	2 Impfungen im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten	



In welchem Alter impfen?	Gegen welche Krankheit?	Standardimpfung / Impfschutz		
Standardimpfungen für Frauen im gebärfähigen Alter und Schwangere				
Frauen im gebärfähigen Alter	Röteln und Windpocken (ergänzend zum Impfschutz für Erwachse)	Prüfung auf Vollschutz und ggf. Nach- Impfung: 2 Rötelnimpfungen (falls fehlend) 2 Windpockenimpfungen (falls keine Anti- körper vorhanden sind)		
Schwangere ab dem 2. Schwangerschafts- drittel	Grippe (Influenza)	1 Impfung ab 2. Schwangerschaftsdrittel		
Schwangere zu Beginn des 3. Schwanger- schaftsdrittels	Keuchhusten	1 Impfung Anfang des 3. Schwanger- schaftsdrittels		



Welche Personengruppen impfen?	Gegen welche Krankheit?	Impfschutz		
Standardimpfungen für Kinder und Jugendliche ab 5 bis 18 Jahren				
Personen, die in Kitas, Gemeinschaftsein- richtungen oder medizinischen Einrich- tungen arbeiten	Masern (bei fehlender Impfung)	2 Impfungen – empfohlen wegen des erhöhten beruflichen Risikos		
medizinisches Personal sowie kranke oder immungeschwächte Patienten	Grippe (Influenza)	1 Impfung jedes Jahr im Herbst		
Personen, die Kontakt zu Neugeborenen haben, z.B. Partner/Partnerin, Großeltern, Babysitter – etwa alle 10 Jahre	Keuchhusten	1 Auffrischimpfung (in Kombination mit Tetanus und Diphtherie)		
Personen, die sich in FSME-Risikogebieten aufhalten – alle drei bis fünf Jahre	FSME = Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis	3 Impfungen 1 Auffrischimpfung		

Stand: Dezember 2021

Den aktuellen Stand der Empfehlungen können Sie auch auf der <u>Website der STIKO</u> nachlesen.